

Miconazol LEM

Miconazol nitrato

Crema

USO EXTERNO

Venta bajo receta
Industria Argentina

FORMULA

Cada 100 g de crema contiene:

Miconazol, nitrato 2 g.

Excipientes: Vaselina líquida 4,17 ml; Propilenglicol 9,48 ml; Alcohol cetosteárico 5,01 g; Polyoxyl 20 cetostearyl ether 1,25 g; Estearato de etilenglicol 2,09 g; Propilparabeno 0,10 g; Metilparabeno 0,10 g; Agua purificada c.s..

ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico de amplio espectro.

INDICACIONES. USO DEL MEDICAMENTO. Lea detenidamente esta información.

Se indica para el tratamiento de las infecciones de la piel causadas por dermatofitos o levaduras y otros hongos tales como en: Tinea capitis, corporis, manuum, barbae, cruris, pedis (pie de atleta).

DOSIFICACION. COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Se recomienda aplicar sobre toda la zona afectada dos veces al día, por la mañana y por la noche. Friccionar suavemente con la yema de los dedos para facilitar la absorción de sus componentes.

El tratamiento deberá efectuarse en forma ininterrumpida hasta la desaparición total de las lesiones.

Si luego de 7 a 10 días, la condición no mejora o empeora, deberá suspenderse el tratamiento y consultar con su médico.

La duración de la terapia varía de acuerdo con la localización y la gravedad de la lesión de 2 a 6 semanas.

El tratamiento debe continuarse por lo menos una semana después de la desaparición de todos los signos y síntomas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evítese el contacto de Miconazol con los ojos.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Conocida hipersensibilidad al nitrato de miconazol o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS

Al igual que ocurre con todas las sustancias aplicadas sobre la piel, puede darse una reacción alérgica al nitrato de miconazol o a otro componente de la crema.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: tel. (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital A. Posadas: tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro Nacional de Intoxicaciones: tel. 0800-333-0160.

CONSERVACION

Conservar entre 15°C y 30°C, en lugar seco y en envase bien cerrado.

PRESENTACION

Envase Hospitalario conteniendo 20 pomos x 15 g.

Envase Hospitalario conteniendo 60 pomos x 30 g.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 54.777

Elaborado por: Laboratorio de Especialidades Medicinales.

Sociedad del Estado/Municipalidad de Rosario.

Lavalle 368/370 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax: 0341-4804166

Directora Técnica: María Yadansa, Farmacéutica.

Código ATC: D01A C02.

Fecha de última revisión: 09/2025.

22411-5