

Vaselina salicilada 2% Ácido salicílico

Ungüento

USO EXTERNO

Venta bajo receta
Industria Argentina

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:
Ácido Salicílico 2 g
Excipientes: Vaselina líquida, 38 g; Vaselina sólida, 60 g.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Queratolítico.

INDICACIONES

Tratamiento de las dermatopatías hiperqueratósicas; en especial, callosidades, ictiosis, xerosis, psoriasis y pitiriasis versicolor.

PROPIEDADES

Es un medicamento que contiene ácido salicílico como principio activo. El ácido salicílico tiene acción queratolítica (disuelve la queratina de la piel). Este medicamento está indicado en el tratamiento de durezas y callosidades así como verrugas comunes en adultos y niños mayores de 12 años.

POSOLOGIA

Callosidades y pitiriasis versicolor:

Tratamiento inicial: aplicación de una fina capa de pomada o pasta al 2% una vez al día. Posteriormente, la concentración se aumenta de forma progresiva hasta el 6% como máximo. El tratamiento debe prolongarse hasta que las lesiones desaparezcan.

Ictiosis y xerosis:

Tratamiento inicial: aplicación de pomada o pasta al 1 % una vez al día. Posteriormente, la concentración se aumenta de forma progresiva hasta el 5% como máximo. El tratamiento debe prolongarse hasta que las lesiones desaparezcan.

Psoriasis:

Aplicación de una fina capa de pomada al 1% o al 2% una vez al día hasta que las lesiones desaparezcan.

PRECAUCIONES

Este medicamento es exclusivamente para uso cutáneo (sobre la piel). Evite el contacto del medicamento con la piel sana, cara, cuello, genitales, ojos y mucosas. Aunque se realice una aplicación cuidadosa, el desprendimiento total o parcial del callo puede producir cierta reacción inflamatoria o enrojecimiento.

CONTRAINDICACIONES

Si es alérgico (hipersensible) al ácido salicílico, o a los salicilatos, o a cualquiera de los demás componentes de Vaselina Salicilada 2%.

Si es diabético o tiene problemas de circulación en las piernas.

Si la piel está infectada, enrojecida, inflamada, irritada o en zonas de la piel que sean dolorosas.

En zonas donde haya lunares.

REACCIONES ADVERSAS

Rara vez se han descrito dermatitis alérgicas por contacto.

El tratamiento de zonas amplias puede provocar un cuadro de salicilismo sistémico, sobre todo en los niños pequeños.

INTERACCIONES

No utilizar al mismo tiempo otros medicamentos que sirvan para el mismo propósito de eliminación de callosidades, durezas o verrugas, como por ejemplo medicamentos que contengan peróxido de benzoilo, resorcinol, azufre, tretinoina o con preparados tópicos que contengan alcohol. El uso combinado de estos productos podría potenciar sus efectos y aumentar los efectos adversos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar entre 15° y 30° C. en lugar seco y al abrigo de la incidencia directa de la luz.

PRESENTACIÓN:

Envase hospitalario con 20 y 80 pomos de 25 g.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe

Resolución Nº1249/09.

Elaborado por: Laboratorio de Especialidades Medicinales.

Sociedad del Estado/Municipalidad de Rosario.

Lavalle 368/370 - Rosario - Santa Fe - Argentina. Tel: 0341-4804166

Directora Técnica: María Yadansa, Farmacéutica.

Código ATC: D02AF

Última revisión: Enero de 2026.

22494-2